



## ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018

12:30 – 13:15 Περιστατικό 5: Λάθη στην τοποθέτηση της πεικής πρόθεσης

1. Πως επιτυγχάνεται η διόγκωση της βαλάνου μετά την τοποθέτηση της πεικής πρόθεσης;
  - α. Ενδοουρηθρικά αλπροσταδίλη
  - β. PDE5-Is
  - γ. Αντλίες κενού
  - δ. Ενδοσηραγγώδεις ενέσεις
  - ε. A+B+Γ σωστά**
2. Κατά τη διαστολή των σηραγγωδών διαπιστώνεται αίμα στο έξω στόμιο της ουρήθρας.
  - α. Συνέχιση της επέμβασης και παραμονή του καθετήρα για 7 ημέρες
  - β. Αναβολή τοποθέτησης και επανεπέμβαση σε 3 μηνες
  - γ. Ανοικτή αποκατάσταση κάκωσης και ολοκλήρωση της επέμβασης
  - δ. B+Γ σωστά**
3. Τρεις εβδομάδες μετά την τοποθέτηση πεικής πρόθεσης διαπιστώνεται φλεγμονή και συλλογή υγρού στο όσχεο.
  - α. Παροχέτευση συλλογής και χορήγηση αντιβιοτικών
  - β. Χειρουργικός καθαρισμός και τοποθέτηση παροχέτευσης
  - γ. Αφαίρεση πρόθεσης και επανεπέμβαση σε 2<sup>ο</sup> χρόνο**
  - δ. A+B σωστά
4. Κατά την τοποθέτηση πεικής πρόθεσης με οσχεοπεικική προσπέλαση διαπιστώνεται αδυναμία προσέγγισης του χώρου του Retzius από την ίδια τομή, λόγω εκτεταμένων συμφύσεων.
  - α. Προσέγγιση με 2<sup>η</sup> τομή
  - β. Αναβολή χειρουργείου
  - γ. Έκτοπη τοποθέτηση στη θήκη του ορθού κοιλιακού
  - δ. A+Γ σωστά**
5. Κατά την έκπλυση ενός σηραγγώδους διαπιστώνεται έξοδος ποσότητας του διαλύματος από το άλλο σηραγγώδες.
  - α. Πρόκειται για distal crossover
  - β. Υπάρχει πιθανότητα κάκωσης ουρήθρας που πρέπει να διερευνηθεί
  - γ. Είναι φυσιολογικό, τα σηραγγώδη επικοινωνούν μέσω του septum**
  - δ. A+Γ σωστά